

CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE

www.osakidetza.euskadi.eus/cevime

▼ XIGDUO® (Dapagliflozina/Metformina)

Solo se han destacado aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más criticables.

FOLLETO PROMOCIONAL ORIGINAL: ESREKL0033 ERSYM0927 ESCRE0459 ESDBYD0235 ESDFOR0336 ESDXIG0055 ESDONG0165 ESDKOM0163 MAYO 2015.

▼ forxiga®
(dapagliflozina)

NUEVO
▼ xigduo®
(dapagliflozina y metformina HCl)

Porque en DM2 el **control** y la **experiencia** tienen peso



Es un dato del **subgrupo de pacientes** con $HbA_{1c} > 9\%$ (n=18) tratados con dapagliflozina 10 mg/metformina a las 24 semanas.

Si se compara con el total de **pacientes** (n= 135) tratados con dapagliflozina 10 mg/metformina, el resultado es menos promocional: $-0,84\%^4$.



Baja incidencia de hipoglucemias**
y más de **1 año de experiencia**
con dapagliflozina en España¹

Dosis única[#] y ahora también en combinación a dosis fija con metformina²

[#]Dosis única de dapagliflozina. En la combinación hay disponible 2 dosis fijas de metformina.



Aclarando la posología:

la dosis única es para dapagliflozina en monoterapia.
La asociación dapagliflozina/metformina se administra dos veces al día.



Terapia añadida a insulina^{1,2}

BIBLIOGRAFÍA

- Ficha Técnica Xigduo®. Disponible en la página web <http://www.emea.europa.eu/>. Acceso: Marzo 2015.
- Bailey CJ, Gross JL, Pieters A, Bastien A, List JF. Effect of dapagliflozin in patients with type 2 diabetes who have inadequate glycaemic control with metformin: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. The Lancet. Volume 375, Issue 9733, 2223-33.

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la **ficha NME n° 232/2016** y en su informe.