

CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE


www.osanet.euskadi.net/cevime/es

▲ XERISTAR®

(Duloxetina en el trastorno de ansiedad generalizada)

Sólo se han destacado aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más criticables.

Folleto promocional original: XERISTAR®: Sp/XERI223;
CYMBALTA®: no hay folleto promocional para la nueva indicación



¡Ojo! Más eficaz...
¡que placebo!
¿Dónde está la comparación frente a otros fármacos indicados en trastorno de ansiedad generalizada, como la paroxetina?

Xeristar® 60 mg es eficaz en el tratamiento de la depresión, los síntomas ansiosos y físicos dolorosos. (1)

¿Y para qué cambiar?
Aún no se ha comparado frente a paroxetina, y frente a venlafaxina sólo ha demostrado no inferioridad.

Ni éste ni ningún fármaco están exentos de efectos adversos.
Duloxetina, por ejemplo: náuseas (25%), cefalea (15%), sequedad de boca (14%),...

- El cambio de ISRS o venlafaxina a duloxetina es eficaz y presenta buena tolerabilidad. (12)
- Perfil de seguridad y tolerabilidad avalado por estudios realizados en más de 24.000 pacientes. (7)



BIBLIOGRAFÍA ORIGINAL DEL FOLLETO PUBLICITARIO

- Russell JM, Weisberg R, Fava M, Hartford JT, Erickson JS, D'Souza DN. Efficacy of duloxetine in the treatment of generalized anxiety disorder in patients with clinically significant pain symptoms. *Depress Anxiety*. 2008;25(7):E1-11.
- Koponen H, Allgulander C, Erickson J, Dunayevich E, Pritchett Y, Detke MJ, et al. Efficacy of duloxetine for the treatment of generalized anxiety disorder: Implications for primary care physicians. *Prim Care Companion J Clin Psychiatry*. 2007;9:100-7.
- Gahimer J, Wernicke J, Yalcin I, Ossanna MJ, Wulster-Radcliffe M, Viktrup L. A retrospective pooled analysis of duloxetine safety in 23,983 subjects. *Curr Med Res Opin*. 2007;23(1):175-84.
- Perahia DG, Quail D, Desai D, Corruble E, Fava M. Switching to duloxetine from selective serotonin reuptake inhibitor antidepressants: a multi-center trial comparing 2 switching techniques. *J Clin Psychiatry*. 2008;69(1):95-105.

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la ficha NME nº 158/2009 y su informe