

CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE

www.osanet.euskadi.net/cevime/es

▲ PRILIGY® (Dapoxetina)

Sólo se han destacado aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más criticables.

Folleto promocional original: P7698 Junio 2009.



Se trata de una mejora respecto a placebo de 0,7 min¹.
¿Es esto clínicamente relevante?

Efectos adversos observados²:

	Dapoxetina	
	30 mg	60 mg
Náusea	11%	21,2%
Mareo	5,8%	11,7%
Síncope (pérdida de consciencia)	0,06%	0,23%

- En 5 estudios con más de **6.000 pacientes. PRILIGY®** ha demostrado una **mejora significativa en el tiempo** hasta la eyaculación.^{2,3}
- Con **PRILIGY®**, los pacientes mostraron un **mejor control** durante sus relaciones sexuales.¹⁻³

- **PRILIGY®** reduce la sensación de angustia y **aumenta el grado de satisfacción.**¹⁻³
- **PRILIGY®** mejoró significativamente todos los aspectos de la eyaculación precoz y fue **generalmente bien tolerado.**¹

BIBLIOGRAFÍA ORIGINAL DEL FOLLETO PUBLICITARIO

1. Buvat J, Tesfaye F, Rothman M, Rivas DA, Giuliano F. Dapoxetine for the treatment of premature ejaculation: results from a randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial in 22 countries. Eur Urol. 2009;55(4):957-67.
2. Ficha técnica Priligy® (Janssen-Cilag).
3. Hellstrom WJ. Emerging treatments for premature ejaculation: focus on dapoxetine. Neuropsychiatr Dis Treat. 2009;5:37-46.

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la ficha NME nº 164/2010 y su informe