

CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE

www.osakidetza.euskadi.net/cevime

PROCORALAN® y CORLENTOR® (Ivabradina en insuficiencia cardiaca crónica)


Sólo se ha destacado aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más criticables.

FOLLETO PROMOCIONAL ORIGINAL: PROCORALAN® 13 II CC 3M 11/12; CORLENTOR® COR-05-12/009.

Novedades de **Procoralan**
en insuficiencia cardiaca

CORLENTOR
IVABRADINA
Nueva indicación en
Insuficiencia Cardíaca*

En un análisis del estudio SHIFT publicado recientemente se evaluó el efecto de ivabradina sobre los pacientes con IC según presentaban una FC ≥ 75 lpm o < 75 lpm. En el grupo con FC ≥ 75 lpm, la adición de ivabradina redujo significativamente el criterio principal (muerte cardiovascular u hospitalización por IC), la mortalidad por todas las causas, la mortalidad cardiovascular, la mortalidad por IC y la hospitalización por IC.



Son datos de un análisis del subgrupo de pacientes con FC ≥ 75 lpm. En los pacientes de este subgrupo con dosis diana de betabloqueantes no se observaron diferencias significativas ni en la variable principal (HR=0,97%; IC95%: 0,74 a 1,28) ni en las variables secundarias*.

* Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). EPAR. Procoralan (ivabradine); mar 2012. EMA/194513/2012. EMEA/H/C/000597/II/0018 European Medicines Agency.