

CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE

www.osakidetza.euskadi.net/cevime

▲ PALEXIA® (Tapentadol)


Sólo se ha destacado aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más criticables.

Folleto promocional original: PALEXIA®: PLX120111.

▲ PALEXIA® retard
TAPENTADOL

Y menos abandonos del tratamiento, con mejor cumplimiento terapéutico^{14,17}

Incidencia de acontecimientos adversos originados en el
tratamiento (AAOT) que obligaron a abandonar el estudio



¿Por qué no muestran
los abandonos por
falta de eficacia?

En el cumplimiento terapéutico,
además de los acontecimientos
adversos, influye la eficacia.

Con tapentadol, hay más
abandonos por falta de eficacia*:

Tapentadol: 6,2%
Oxycodona: 3,4%
Placebo: 16,4%

AAOT, acontecimientos adversos originados en el tratamiento; LP, Liberación prolongada; LC, Liberación controlada

* Los pacientes podían informar de más de un AAOT como motivo de abandono del tratamiento

Flügel¹⁸

(AAOT) Incidencia de acontecimientos adversos originados en el tratamiento que obligaron a abandonar el estudio en al menos 2% de los pacientes en cualquier grupo de tratamiento*

BIBLIOGRAFÍA ORIGINAL DEL FOLLETO PROMOCIONAL

- Lange B, Kuperwasser B, Okamoto A, Steup A, Häufel T, Ashworth J, et al. Efficacy and safety of tapentadol prolonged release for chronic osteoarthritis pain and low back pain. *Adv Ther.* 2010; 27(6): 381-399.
- Wild JE, Grond S, Kuperwasser B, Gilbert J, McCann B, Lange B, et al. Long-term safety and tolerability of tapentadol extended release for the management of chronic low back pain or osteoarthritis pain. *Pain Pract.* 2010; 10 (5): 416-427.
- Flügel M, Lange R, Okamoto A, Steup A, Rauschkolb C, Ashworth J. A pooled analysis of discontinuations in Phase 3 studies of tapentadol prolonged release. Poster presented at the Annual Scientific Meeting of the British Pain Society (BPS); 2010 Apr 13-16; Manchester, England.

BIBLIOGRAFÍA

- *. Lange B, Kuperwasser B, Okamoto A, Steup A, Häufel T, Ashworth J, et al. Efficacy and safety of tapentadol prolonged release for chronic osteoarthritis pain and low back pain. *Adv Ther.* 2010;27(6):381-99. Epub 2010 Jun 11. Erratum in: *Adv Ther.* 2010;27(12):981.

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la [ficha NME nº 195/2012](#) y su informe